



## ABEMACICLIB - VERZENIOS®

### Qu'est-ce que VERZENIOS

| Description de la molécule | Description                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abémaciclib                | Comprimé de 50 mg : beige, Comprimé de 100 mg : blanc, Comprimé de 150 mg : jaune |

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit 1 comprimé de ..... mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper ou disperser les comprimés.

A prendre à heure fixe, pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Deux prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas |  |
| En continu J1 - J28                                                |  |

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos fonctions rénale et hépatique) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre VERZENIOS® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de jus de pamplemousse avec VERZENIOS®



## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

| Effets indésirables                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les plus fréquents                                                                                               | <p><b>Troubles digestifs</b> : diarrhées, nausées, vomissements, troubles du goût, perte d'appétit</p> <p><b>Anomalies du bilan biologique</b> : des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), anomalie du bilan hépatique</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruptions, sécheresse, démangeaisons, perte de quelques cheveux</p> <p><b>Troubles de la vision</b> : larmoiement excessif</p> <p><b>Troubles vasculaires</b> : phlébite</p> <p><b>Autres</b> : infections, fatigue, vertiges</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quand alerter l'équipe médicale?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques | <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température &gt; 38,5 °C</li> <li>• Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>• Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>• Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une phlébite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mollet rouge, chaud et douloureux</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> |
| Comment prévenir les effets indésirables?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Infection                                                                                                        | <b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids                                                                                                            | <b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fatigue                                                                                                          | <b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...<br><b>Alternez</b> période d'activité et de repos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yeux                                                                                                             | <b>Evitez</b> de conduire en cas de faible luminosité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chute des cheveux                                                                                                | <b>Utilisez</b> un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité.<br><b>Privilégiez</b> une brosse souple.<br><b>Evitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment. <b>Evitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diarrhée                                                                                                         | <b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes.<br><b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.<br><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nausées                                                                                                          | <b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.<br><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perte d'appétit  | <b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »                                                           |
| Troubles du goût | <b>Favorisez</b> une alimentation tiède ou froid en plusieurs petits repas par jour.<br><b>Évitez</b> les ustensiles de cuisine métalliques. |

