
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE ONCOLIEN®

Fiche patient

APALUTAMIDE - ERLEADA®

Qu'est-ce que ERLEADA

Description de la molécule	Description
Apalutamide	Comprimé de 240 mg : ovale, blanc et comprimé de 60 mg : ovale, jaunâtre à vert grisâtre 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... /jour, soit ..... comprimé(s) de ..... mg, à prendre en une seule prise, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre à heure fixe. Pendant ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 24 heures. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique, votre cholestérol et vos électrolytes dont le potassium) et clinique (tension artérielle, bilan thyroïdien et électrocardiogramme (ECG)) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 3 mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ERLEADA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de jus de pamplemousse avec ERLEADA®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	**Anomalies du bilan biologique :** augmentation du cholestérol (hypercholestérolémie) et des triglycérides (hypertriglycéridémie) **Troubles cardiovasculaires :** hypertension artérielle **Troubles cutanés :** éruptions **Troubles digestifs :** diarrhées, troubles du goût **Troubles musculosquelettiques :** fractures, douleurs articulaires (arthralgies) **Autres :** hypothyroïdie, convulsions, fatigue, perte de poids, chute
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	**Symptômes évocateurs d'une hypertension** • Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges • Augmentation des chiffres lors de la prise de tension **Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque** • Essoufflement, palpitations, douleurs ou oppression thoracique • Perte de connaissance **Troubles digestifs** • En cas de perte de poids importante et/ou rapide • Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour **Douleurs empêchant vos activités habituelles** • Douleurs articulaires **Symptômes évocateurs d'une ostéoporose** • Fractures
Comment prévenir les effets indésirables?	
Suivi de la tension artérielle	Une tension artérielle élevée doit être corrigée. **Une mesure de la tension artérielle est recommandée** régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à la faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Soins de la peau	**Privilégiez** *pour la toilette* un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. **Evitez** toute utilisation de produits irritants. *Pour se protéger du soleil*, **utilisez** un écran total et **évitez** les expositions.
Douleurs articulaires	**Pratiquez** une activité physique adaptée.
Fatigue	**Privilégiez** des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... **Alternez** période d'activité et de repos.
Poids	**Surveillez** régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Diarrhées	**Privilégiez** une alimentation pauvre en fibres. **Consommez** de préférence des féculents, des carottes, des bananes. **Evitez** de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. **Buvez** de l'eau de façon abondante.
Troubles du goût	**Favorisez** une alimentation tiède ou froid en plusieurs petits repas par jour. **Evitez** les ustensiles de cuisine métalliques.

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Société Française de Pharmacie Oncologique