



BOSUTINIB - BOSULIF®

Qu'est-ce que BOSULIF

Description de la molécule	Description
bosutinib	<p>Comprimé de 100 mg : ovale, jaune Comprimé de 500 mg : ovale, rouge</p> 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de mg/jour, soit comprimé(s) de 100mg et comprimé(s) de 500 mg à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés

A prendre A heure fixe. Pendant un repas.

en cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 12 heures. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, au cours d'un repas									
En continu								...	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipiez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (Prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique, votre potassium, votre magnésium et vos triglycérides) et clinique (électro-cardiogramme).

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (Préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre BOSULIF® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Eviter la consommation de Millepertuis, pamplemousse, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Passiflore avec le BOSULIF®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : diarrhées, nausées, douleurs abdominales, vomissements</p> <p>Troubles de la numération de la formule sanguine : baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie)</p> <p>Troubles cutanés : rash, démangeaisons</p> <p>Rétention d'eau : gonflement des membres et/ou du visage</p> <p>Autres : fièvre, fatigue, maux de tête, troubles de la fonction hépatique</p>
Certains effets nécessitent une attention particulière	Patients porteurs chroniques du virus de l'hépatite B (risque de réactivation de la maladie)
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Symptômes évocateurs d'une infection Température > 38,5 °C Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p>Symptômes évocateurs d'une hypertension Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</p> <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque ou d'une rétention d'eau Perte de connaissance, palpitations Gonflement des chevilles, des pieds ou des jambes, difficultés respiratoires Prise de poids rapide et inexpliquée</p> <p>Troubles digestifs En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleur intense dans le ventre</p> <p>Symptômes évocateurs d'un syndrome de lyse Coloration de vos urines Diminution de la quantité d'urine éliminée Douleur sur un côté en dessous des côtes</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	<p>Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...).</p> <p>Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protègera.</p>
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou de rétention d'eau.
Soins de la peau	<p>Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Evitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</i></p>



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Rétention d'eau (gonflement des membres)	Evitez les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés. Surélevez vos pieds. Surveillez régulièrement votre poids.
Comment adapter son alimentation?	
Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante.
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés.
Rétention d'eau	Privilégiez une alimentation pauvre en sel.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>