



## BRIGATINIB - ALUNBRIG®

### Qu'est-ce que ALUNBRIG

Description de la molécule	Description
Brigatinib	Comprimé de 30mg: blanc, rond Comprimé de 90 mg : blanc, ovale Comprimé de 180 mg : blanc, ovale

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de ..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de ..... mg, à prendre 1 fois par jour tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A prendre à heure fixe, au moment ou en dehors d'un repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas			
En continu		J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 ... J28	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre glycémie, vos CPK et vos fonctions hépatique, rénale et pancréatique) et clinique (tension artérielle) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (Contraception mécanique et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ALUNBRIG® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de jus de pamplemousse, Millepertuis et de certains compléments pouvant favoriser une hypertension comme Ginkgo Biloba, Orange de Séville, Petit Houx, Réglisse Yohimbe avec Alunbrig®

### Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Bilan biologique:</b> anomalie du bilan hépatique et/ou pancréatique, augmentation de la glycémie et/ou des CPK, baisse de l'hémoglobine (anémie), de globules blancs (leucopénie)</p> <p><b>Troubles digestifs :</b> nausées, vomissements, diarrhées, constipation, bouche enflammée (aphtes)</p> <p><b>Troubles cutanés :</b> éruption, sensibilité au soleil</p> <p><b>Troubles au niveau des poumons :</b> toux, gêne respiratoire</p> <p><b>Troubles cardio-vasculaires:</b> hypertension artérielle, troubles de la fonction cardiaque</p> <p><b>Douleurs :</b> maux de tête, douleurs au niveau des muscles (myalgies),</p> <p><b>Neuropathies :</b> troubles de la sensibilité (engourdissement, fourmillement, picotement), sensation de brûlure ou de décharges électriques, douleurs au froid, à la chaleur ou aux changements de température</p> <p><b>Autres :</b> fatigue, troubles du sommeil, troubles de la vision</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	<p>Patients diabétiques (hyperglycémie)</p> <p>Patients intolérants au lactose</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>&gt; Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; perte de connaissance, vertiges</li> <li>&gt; chute de la tension artérielle</li> </ul> <p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleurs dans la bouche ou aphes empêchant une alimentation normale</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> <li>&gt; Moins de 3 selles par semaine</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière</li> </ul> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mauvaise tension</li> <li>&gt; Douleurs musculaires</li> <li>&gt; Troubles de la sensibilité</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Hygiène dentaire	<b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, <b>réalisez</b> des bains de bouche au bicarbonate de sodium. <b>Evitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Soins de la peau	<b>Privilégiez</b> pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Evitez</b> toute utilisation de produits irritants.



Protection solaire	<b>Utilisez</b> un écran total et évitez les expositions (indice 50). <b>Privilégiez</b> des vêtements couvrants : à manches longues et à col, les pantalons longs et les chapeaux.
Yeux	<b>Evitez</b> le port de lentilles de contact. <b>Evitez</b> de conduire en cas de faible luminosité
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.
Infection	Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
<b>Comment adapter son alimentation?</b>	
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Evitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>