SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE ONCOLIEN®

Fiche patient

ERDAFITINIB - Balversa®

Qu'est-ce que Balversa

Description de la molécule	Description
Erdafitinib	Comprimés ronds dosés à 3 mg (jaunes), 4 mg (oranges) et 5 mg (marrons) 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de ..... mg à prendre 1 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans broyer, mâcher ou dissoudre les comprimés.

A prendre A heure fixe, pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli dans les 12 heures, prendre la prise. En cas de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et votre taux de phosphates dans le sang) et clinique (Consultez un ophtalmologiste tous les mois lors des 4 premiers mois de traitement puis tous les trimestres) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (Préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre Balversa® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Exemple : Évitez la consommation de jus de pamplemousse, Millepertuis, Levure de riz rouge avec le Balversa ® .

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	**Troubles au niveau des yeux :** vision trouble, baisse de la vision, sécheresse occulaire. **Anomalies du bilan biologique :** élévation des taux de phosphates dans le sang, de la créatininémie, baisse de l'hémoglobine (anémie), anomalies du bilan hépatique **Troubles digestifs :** constipation, nausées, diarrhées, douleurs abdominales, bouche enflammée (stomatite), perte d'appétit, troubles ou perte du goût (et de l'odorat), augmentation du poids **Ongles** : paronychie (infection des ongles), malformation, modification de la couleur, de?collement des ongles **Troubles cutanés :** sécheresse de la peau, inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement **Troubles généraux:** Fatigue, perte d'appétit, perte de poids
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	**Troubles au niveau des yeux** Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière **Troubles digestifs** • En cas de perte de poids importante et/ou rapide • Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour • Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale • Douleur intense dans le ventre • Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. • Moins de 3 selles par semaine **Troubles musculaires** Douleurs inhabituelles et inexpliquées dans les muscles
Comment prévenir les effest indésirables?	
Hygiène dentaire	**Utilisez** une brosse à dent souple, **réalisez** des bains de bouche au bicarbonate de sodium. **Evitez** les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Ongles	**Evitez** les traumatismes de vos ongles des mains et des pieds. Ne mettez pas de vernis sauf si c'est un vernis (protecteur) qui vous a e?te? conseille? spe?cifiquement par l'e?quipe soignante. **Privile?giez** une coupe des ongles droits et pas trop courts.
Soins de la peau	**Sur vos mains et vos pieds** : Appliquez une cre?me ou un lait hydratant et/ou une cre?me cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement). **Evitez** d'exposer vos mains et vos pieds a? la chaleur (eau chaude). Evitez les activite?s qui ge?ne?rent des frottements ou des plaies. **E?vitez** le port de ve?tements, chaussettes et chaussures trop serre?es **Protégez** vous du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions **Corps : Privile?giez** pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un se?chage par tamponnement. Evitez toute utilisation de produits irritants.
Yeux	**Evitez** le port de lentilles de contact. **Utilisez** systématiquement des larmes artificielles (idéalement toutes les 2 heures en période d'activité) **Evitez** de conduire en cas de faible luminosité

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Société Française de Pharmacie Oncologique

Fatigue	**Privilégiez** des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport… **Alternez** période d'activité et de repos.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Nausées	**Privilégiez** une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. **Limitez** les aliments gras, frits et épicés
Constipation	**Privilégiez** une alimentation enrichie en fibres. **Buvez** de l'eau de façon abondante.
Diarrhées	**Privilégiez** une alimentation pauvre en fibres. **Consommez** de préférence des féculents, des carottes, des bananes. **Evitez** de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. **Buvez** de l'eau de façon abondante
Trouble du goût	**Favorisez** une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour. **Evitez** les ustensiles de cuisine métalliques.
Bouche enflammée (aphtes)	**Evitez** la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.
Augmentation du taux de phosphates dans le sang	Contrôler la consommation de phosphates à 600-800 mg/j (principales sources alimentaires de phosphore : retenir en particulier le lait, le chocolat, les œufs, les oléagineux, le poisson, les abats (principalement le foie), la viande et les boissons gazeuses.

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com