



ETOPOSIDE - CELLTOP®

Qu'est-ce que CELLTOP

Description de la molécule	Description
Etoposide	Capsule molle de 50 mg 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.



Dans votre cas, elle est de mg/jour, soit capsules de 50 mg, à prendre fois / jour.
Un cycle dure semaines, le CELLTOP® doit être pris pendant jours consécutifs puis arrêté jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les capsules

A prendre à heure fixe au moment ou en dehors des repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 ou 3 prises par jour, à heure fixe, à jeun en dehors d'un repas	  
Prise de 21 jours consécutifs tous les 28 jours (7 jours d'arrêt)	
Prise de 3 jours (J1 J3 J5) à 5 jours tous les 28 jours	
Prise de 3 jours (J1 J3 J5) à 5 jours tous les 21 jours	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller la numération de la formule sanguine avant chaque début de cycle et votre fonction hépatique) et clinique (tension artérielle).

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CELLTOP® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation d'Olivier avec le CELLTOP®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	Anomalie du bilan biologique : baisse de l'hémoglobine (anémie), des globules blancs (leucopénie), des polynucléaires neutrophiles (neutropénie) et des plaquettes (thrombopénie), anomalie du bilan hépatique Troubles digestifs : douleurs abdominales, perte de poids, constipation, nausées, vomissements, diarrhée, bouche enflammée (aphtes) Troubles cutanés : perte des cheveux, démangeaisons, éruption cutanée, pigmentation de la peau Autres: fatigue, malaise, vertiges Troubles de la fonction cardiaque, hypertension
Certains nécessitent une attention particulière	Patients intolérants au fructose
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	Troubles digestifs > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. > Moins de 3 selles par semaine Symptômes évocateurs d'une infection > Température > 38,5 °C > Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre Symptômes évocateurs d'une hémorragie > sang dans les selles, ou en cas de vomissements > hématomes (bleus), saignements de nez Symptômes évocateurs d'une hypertension > Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges > Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque > Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique Troubles au niveau des poumons > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire Symptômes évocateurs d'un syndrome de lyse > Coloration de vos urines, > Diminution de la quantité d'urine éliminée > Douleur sur un côté en dessous des côtes Troubles cutanés > Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera



Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Hygiène dentaire	Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Evitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool.
Saignements, hémorragie	Evitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) Informez votre médecin: > si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Chute des cheveux	Faites couper vos cheveux. Informez-vous sur les perruques et leur remboursement. Utilisez un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. Privilégiez une brosse souple. Evitez de laver vos cheveux trop fréquemment. Evitez les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.
Constipation	Pour stimuler le transit, pratiquez une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants?	
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Constipation	Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.
Diarrhée	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Bouche enflammée (aphtes)	Evitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

