



LAROTRECTINIB - VITRAKVI®

Qu'est-ce que VITRAKVI

Description de la molécule	Description
Larotrectinib	Gélule de 25mg: blanche, opaque (18 mm de long x 6 mm de large) Gélule de 100mg : blanche, opaque (22 mm de long x 7 mm de large) Solution buvable : incolore à jaune ou orange ou rouge ou brunâtre, flacon de 50mL

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est demg/jour, soit gélule(s) demg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

Dans votre cas, elle est demg/jour, soit mL à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, avaler la gélule en entier. Ne pas l'ouvrir.

A prendre à heure fixe, pendant ou en dehors du repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Deux prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	
En continu	J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 ... J28

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre VITRAKVI® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Eviter la consommation de Pamplemousse et millepertuis

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

Les plus fréquents	Anomalies du bilan sanguin : baisse de l'hémoglobine (anémie), baisse des plaquettes (Thrombopénie), baisse des Polynucléaires neutrophiles (Neutropénie) Troubles digestifs : constipation, nausées, diarrhées, troubles du goût, augmentation du poids Douleurs : muscles (myalgies) Anomalies du bilan biologique : perturbation bilan hépatique (ASAT, ALAT) Autres: vertiges, troubles de la marche
Quand alerter l'équipe médicale ?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	Symptômes d'une infection Température > 38,5 °C Toux, douleur à la gorge, douleur pour uriner Troubles digestifs En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Impossibilité de boire pendant 24h et/ou de manger pendant environ 48h
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protègera
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des varottes, des bananes. Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante.
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides ou froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés.
Troubles du goût	Favorisez une alimentation tiède ou froid en plusieurs petits repas par jour. Evitez les ustensiles de cuisine métalliques.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>