




RUCAPARIB - RUBRACA®

Qu'est-ce que RUBRACA

Description de la molécule	Description
Rucaparib	Comprimé de 200 mg : rond et bleu, Comprimé de 250 mg : blanc et losange, Comprimé de 300 mg : ovale jaune 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/j, soit comprimé de mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper ou disperser les comprimés.

A prendre à heure fixe, pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 prises/jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine et votre fonction rénale.) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à six mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre RUBRACA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de jus de pamplemousse avec RUBRACA®.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, troubles du goût, difficultés à digérer (dyspepsie), douleurs abdominales</p> <p>Anomalies du bilan biologique : baisse des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), anomalie du bilan hépatique</p> <p>Troubles cutanés : éruptions, photosensibilité</p> <p>Autres : infections, fatigue, vertiges</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température > 38,5 °C • Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de perte de poids importante et/ou rapide • Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour • Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	<p>Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...).</p> <p>Une vaccination contre la grippe, le pneumocoque et le covid peut vous être recommandée : elle vous protégera.</p>
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Soins de la peau	<p>Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Évitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</i></p>
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...</p> <p>Alternez période d'activité et de repos.</p>
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Diarrhées	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante.</p>
Nausées	<p>Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p>Limitez les aliments gras, frits et épicés.</p>
Troubles du goût	<p>Favorisez une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour.</p> <p>Évitez les ustensiles de cuisine métalliques.</p>

